



Método de Separación de Variables.

1. Se tiene un cubo conductor de lado a conectado a tierra. Calcular el potencial electrostático en todo punto del espacio dividiendo la región en dos zonas, en cuya frontera común queda ubicado un plano con densidad superficial de carga σ , resolviendo la ecuación de Laplace en cada zona de tal manera que la densidad de carga aparece como condición de contorno en la superficie que divide ambas zonas.




2. Se coloca un alambre con densidad de carga constante λ equidistante a dos placas conductoras infinitas conectadas a tierra. Encuentre el potencial eléctrico en todo punto del espacio utilizando separación de variables. Para ello divida el problema en dos regiones de las siguientes formas:
 - a) Realice un corte vertical, perpendicular a los planos.
 - b) Realice un corte horizontal, paralelo a los planos.

Compare los resultados obtenidos. ¿ Son iguales ?



3. a. Obtener la expresión para el potencial de una carga puntual desarrollado como integral de Fourier (función de Green en coordenadas cartesianas).

- b. Hallar el potencial y el campo electrostático en todo punto del espacio, producido por un cuadrado cargado con densidad uniforme σ .
4. Calcular el potencial electrostático en todo punto del espacio para una esfera cuyo casquete superior está conectado a un potencial V_1 y el inferior a V_2 .
5. Resolver el problema de una carga puntual q entre dos cáscaras esféricas metálicas concéntricas conectadas a tierra.
 - a) Hallar la densidad de carga y la carga total inducida sobre cada esfera.
 - b) Observar qué sucede cuando se hace tender el radio de la esfera exterior a infinito. ¿Cuánto valen las cargas totales inducidas en ese caso ?
 - c) Resolver el problema en el caso en que el potencial de las esferas se eleva a V_1 y V_2 , respectivamente. Usar el principio de superposición.
 - d) Cómo se resolvería el problema de una carga puntual entre dos cascaras esféricas conductoras aisladas con una carga total Q_1 y Q_2 , respectivamente ?
6.
 - a) Hallar el potencial y el campo electrostático en todo punto del espacio, producido por un disco cargado con densidad uniforme σ .
 - b) Verificar que, a través de límites adecuados, la expresión obtenida se reduce a las correspondientes a una carga puntual y a un plano infinito.
 - c) ¿El disco es conductor? ¿Por qué?
7. Una superficie cilíndrica de radio a y altura h , tiene su superficie lateral conectada a tierra, mientras que las tapas se mantienen a potencial V y $-V$. Hallar el potencial en todo punto del espacio.
8. Una superficie cilíndrica de radio a y altura h , tiene sus tapas conectadas a tierra y su superficie lateral se mantiene a un potencial $V(z, \phi)$. Hallar el potencial en todo punto del espacio.
9. Se desea analizar la dependencia de la densidad de carga inducida en un conductor a potencial V con el ángulo que forman las superficies de éste (efecto de puntas). Para simplificar, es conveniente reducir el problema al caso bidimensional como se muestra en la figura, siguiendo los siguientes pasos:
 - a) Realizando separación de variables en coordenadas polares, encuentre la expresión general para el potencial en el espacio exterior al conductor.
 - b) Analizando la expresión para el potencial, obtenga la contribución más importante para el campo eléctrico en la zona cercana a la punta del conductor.
 - c) Encuentre una expresión aproximada para la densidad de carga superficial y analice su singularidad para ángulos β mayores que π (puntas agudas). Muestre que para un conductor delgado del ancho d , la densidad de carga en la punta es proporcional a $d^{-1/2}$.
 - d) Compare con el caso de una punta cónica en tres dimensiones. Referencia: ver Jackson (3^{era} edición) capítulo 2 sección 2.11 y capítulo 3 sección 3.4.



10. *IMAN ESFERICO*: Este problema es muy importante, pues permite practicar los distintos métodos de resolución de problemas magnéticos, entender analogías y diferencias con el caso eléctrico y aprender a pensar en términos de “cargas magnéticas”.

i. Se tiene una esfera uniformemente magnetizada en volumen con densidad $\vec{M} = M_0 \hat{z}$.

- a) Calcular el momento dipolar de la esfera: i) Integrando directamente la densidad de magnetización. ii) Utilizando los conceptos de cargas magnéticas y corrientes de magnetización.
- b) Calcular los campos \vec{B} y \vec{H} usando la integral de Poisson para el potencial escalar magnético. Identificar el problema eléctrico equivalente. Comparar el potencial en el exterior de la esfera con el que produciría un dipolo puntual igual al momento dipolar total de la esfera.
- c) Calcular el potencial vectorial a partir de la corriente total.

ii. Se tiene ahora la misma esfera situada en un medio lineal, isótropo y homogéneo de permeabilidad μ .

- a) Discutir cuidadosamente por qué los métodos utilizados en b) y c) no sirven para hallar \vec{B} en este caso. Utilizar entonces el método de separación de variables. Verificar que si $\mu = 1$ se recupera el resultado anterior.
- b) Hallar el momento dipolar total inducido en el medio exterior.

iii. Una esfera hueca cargada con densidad superficial σ , que rota con velocidad angular $\vec{\omega} = \omega_0 \hat{z}$ constituye un problema equivalente al de la esfera con magnetización uniforme. Probarlo, y haciendo las identificaciones pertinentes, deducir el momento magnético total de la esfera rotante y los campos \vec{B} y \vec{H} producidos por la misma.


11. Considere una esfera dieléctrica de radio a y permitividad ϵ_1 , sumergida en otro medio de permitividad ϵ_2 . A una distancia $d < a$ del centro de la esfera se encuentra una carga q .

- a) Halle el potencial electrostático en todo punto del espacio.
- b) Halle las densidades de carga de polarización en volumen y superficie.

12. Se tiene una esfera homogénea de permitividad ϵ y radio b , concéntrica con una cáscara esférica con densidad de carga $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$ y radio a , tal como se indica en la figura. El conjunto se halla sumergido en un campo eléctrico uniforme al infinito $\vec{E} = E_0 \hat{z}$.

- a) Calcular el potencial en todo punto del espacio.
- b) Hallar la distribución de cargas inducidas en $r = b$.

(*Sugerencia:* pensar que se puede resolver directamente la ecuación de Poisson o dividir la región en zonas).



13. Calcular los campos \vec{B} y \vec{H} en todo punto del espacio producidos por:
- Un imán cilíndrico, finito y permanente, caracterizado por una densidad de magnetización uniforme \vec{M} paralela al eje del cilindro.
 - Un solenoide de las mismas dimensiones por el que circula una corriente I , y que tiene n espiras por unidad de longitud. *Sugerencia:* Usar el resultado del problema 6 y el principio de superposición.
14. Durante una experiencia de laboratorio, es necesario hacer pasar periódicamente un sensor por entre las caras polares de un imán. El sensor es filiforme, con un diámetro de 2 mm, una permeabilidad magnética cercana a 1, y no puede soportar campos magnéticos superiores a 20 gauss. Diseñe un blindaje magnético que lo proteja de los 2000 gauss que produce el imán cuyo campo atraviesa.

Sugerencias: *i* Reduzca el problema real a uno idealizado más simple, a través de suposiciones adecuadas. *ii* Plantee las ecuaciones diferenciales y condiciones de contorno para este problema idealizado. *iii* Utilice los resultados de la Sec. 5.12 del Jackson (3^{era} edición). *iv* Interprete los resultados.

II. Preguntas conceptuales

- Explicar las diferencias entre una solución de la ecuación de Poisson (inhomogénea), de Laplace (dividiendo en zonas) y una solución hallada por superposición. ¿Qué pasa con las condiciones de contorno?
- ¿Cómo puede calcularse el potencial producido por una carga puntual en el centro de un cilindro conductor de radio a y altura h a potencial V ? ¿En cuántas variables se presenta el problema de Sturm- Liouville?
- Una carga puntual está ubicada en el origen de coordenadas, dentro de una caja cilíndrica a potencial cero. La caja está definida por $z = -h/2$, $z = h/2$ y $r = a$.
 - Se plantea la posibilidad de encarar el problema por dos métodos distintos: dividiendo en zonas y resolviendo Laplace o directamente por Poisson. Discutir por qué uno de ellos es muy poco práctico en este problema.

- ii. Se podría calcular el potencial planteando problema de Sturm-Liouville en cualquiera de las tres variables. Entonces, ¿no debería ser $\Phi = 0$ la única solución, eeh?
4. ¿Cuál es el menor número de regiones en que puede dividirse el problema de la figura, para calcular el potencial por el método de separación de variables?

